


BJERGAND (*Aythya marila*)

Scaup

Bjergand har jagttid fra 1. oktober til 31. januar. Udbyttet af bjergænder har ligget på nogle få hundrede fugle per år.


Antal og fordeling – Number and distribution

I 2004/05 blev der indsendt 15 vinger af bjergand.




Figur 1. Geografisk fordeling af 15 vinger af bjergand indsendt gennem jagtsæsonen 2004/05.

Geographical distribution of 15 wings from Scaup received during the hunting season 2004/05.



Figur 2. Antallet af indsendte vinger af bjergand fra jagtsæsonerne 1982/83-2004/05.
The number of Scaup wings received from the hunting seasons 1982/83-2004/05.


Tidsmæssig fordeling – *Temporal distribution*



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af bjergand nedlagt i jagtsæsonen 2004/05 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1994/95-2003/04 med 95 % konfidens intervaller.

Temporal distribution of wings from Scaup bagged during the 2004/05 hunting season and the mean and 95% confidence intervals of the period 1994/95-2003/04.


Køns- og alderssammensætning – *Sex and age composition*



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af bjergandevinger gennem jagtsæsonerne 1994/95-2004/05. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.

Sex and age composition of Scaup wings during the hunting seasons 1994/95-2004/05. The number of wings is shown below columns (columns from above: juv. female, juvenile male, adult female and adult male.)

Ynglesucces – *Reproductive success*



Figur 5. Ynglesucces for bjergand, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1982/83-2003/04.

Reproductive success of Scaup expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1982/83-2003/04.