


Skovsneppe (*Scolopax rusticola*)

Woodcock

Skovsneppe har indtil sæsonen 2003/04 haft jagttid fra 1. oktober til 31. december. Fra og med sæsonen 2004/05 blev jagttiden udvidet til at omfatte perioden fra 1. oktober til 15. januar. Udbyttet af skovsneppe har de seneste år ligget på små 40.000 fugle per år.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

I 2004/05 blev der indsendt 1293 vinger af skovsneppe, hvilket er ny rekord.



Figur 1. Geografisk fordeling af 1293 vinger af skovsneppe indsendt gennem jagtsæsonen 2004/05.


Geographical distribution of 1293 wings from Woodcock received during the hunting season 2004/05.



Figur 2. Antallet af indsendte vinger af skovsneppe fra jagtsæsonerne 1985/86-2004/05.

The number of Woodcock wings received from the hunting seasons 1985/86-2004/05.


Tidsmæssig fordeling – *Temporal distribution*



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af skovsneppe nedlagt i jagtsæsonen 2004/05 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1985/86-2003/04 med 95 % konfidens intervaller.

Temporal distribution of wings from Woodcock bagged during the 2004/05 hunting season and the mean and 95% confidence intervals of the period 1985/86-2003/04.


Køns- og alderssammensætning – *Sex and age composition*



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af skovsneppevinger gennem jagtsæsonen 2004/05. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.

Sex and age composition of Woodcock wings during the hunting season 2004/05. The number of wings is shown below columns (columns from above: juvenile, adult)

Ynglesucces – *Reproductive success*



Figur 5. Ynglesucces for skovsneppe, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1985/86-2003/04.

Reproductive success of Woodcock expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1985/86-2003/04.