


SORTAND (*Melanitta nigra*)

Common Scoter

Sortand har før 2004 haft jagttid fra 1. oktober og frem til 31. januar. Fra og med sæsonen 2004/05 er jagttiden forlænget så sortand må skydes frem til 15. januar. Udbyttet af sortand har i de seneste år ligget omkring 5000 fugle pr. år.


Antal og fordeling – Number and distribution

Fra jagtsæsonen 2004/05 blev der indsendt 167 vinger af sortand.




Figur 1. Geografisk fordeling af 167 vinger af sortand indsendt fra jagtsæsonen 2004/05.

Geographical distribution of 71 wings from Common Scoter received during the hunting season 2004/05.




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af sortand fra jagtsæsonerne 1982/83-2004/05.
The number of Common Scoter wings received from the hunting seasons 1982/83-2004/05.

Tidsmæssig fordeling – *Temporal distribution*



Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af sortand nedlagt i jagtsæsonen 2004/05 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1994/95-2003/04.
Temporal distribution of wings from Common Scoter bagged during the 2004/05 hunting season and the mean of the period 1994/95-2003/04.


Køns- og alderssammensætning – *Sex and age composition*



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af sortand vinger gennem jagtsæsonen 2004/05. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.

Sex and age composition of Common Scoter wings during the hunting season 2004/05. The number of wings is shown below columns (columns from above: juv. female, juvenile male, adult female and adult male.)

Ynglesucces – *Reproductive success*



Figur 5. Ynglesucces for sortand, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1982/83-2003/04.

Reproductive success of Common Scoter expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1982/83-2003/04.