


SORTAND (*Melanitta nigra*)

Common Scoter

Sortand har før 2004 haft jagttid fra 1. oktober og frem til 31. januar. Fra og med sæsonen 2004/05 er jagttiden forlænget så sortand desuden må skydes i perioden 1. til 15. februar på fiskeriterritoriet uden for EU-fuglebeskyttelsesområder. Udbyttet af sortand har i de seneste år ligget omkring 5000 fugle pr. år.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

Fra jagtsæsonen 2005/06 blev der indsendt 145 vinger af sortand.




Figur 1. Geografisk fordeling af 144 vinger af sortand indsendt fra jagtsæsonen 2005/06.

Geographical distribution of 144 wings from Common Scoter received during the hunting season 2005/06.




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af sortand fra jagtsæsonerne 1982/83-2005/06. *The number of Common Scoter wings received from the hunting seasons 1982/83-2005/06.*

Tidsmæssig fordeling – Temporal distribution




Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af sortand nedlagt i jagtsæsonen 2005/06 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1994/95-2004/05. *Temporal distribution of wings from Common Scoter bagged during the 2005/06 hunting season and the mean of the period 1994/95-2004/05.*

Køns- og alderssammensætning – Sex and age composition



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af sortand vinger gennem jagtsæsonen 2005/06. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.
Sex and age composition of Common Scoter wings during the hunting season 2005/06. The number of wings is shown below columns (columns from above: juvenile female, juvenile male, adult female and adult male.)

Ynglesucces – Reproductive success



Figur 5. Ynglesucces for sortand, udtrykt som antal ungfugle per gammel hun i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1982/83-2005/06.
Reproductive success of Common Scoter expressed as the number of juveniles per adult female of received wings from the hunting seasons 1982/83-2005/06.