

DMUs vingeundersøgelse 2006/2007

DMU modtog i alt 16.280 vinger i sæsonen 2006/2007, hvilket er en markant fremgang i forhold til forrige sæson. Som normalt var langt størsteparten af vingerne fra svømmeænder (i alt 9.787), med krikand som den talrigeste. Antallet af vinger fra dykænder blev i alt 3.427, med ederfugl som den talrigeste. Trods den generelle fremgang, blev der kun indsendt halvt så mange vinger af skalleslugere sammenlignet med 2005/2006. Der blev indsendt i alt 891 gåsevinger, med grågås og kortnæbbet gås som de talrige arter. Dobbeltbekkasin (i alt 685) og Skovsneppe (i alt 1.242) blev indsendt i lidt større antal end i sidste sæson. Antallet af de enkelte arter kan ses i Tabel 1.

Art	gl. han	gl. hun	ung han	ung hun	ung/gl. hun	Antal
	Procent					
Gråand	22,0	12,6	36,2	29,3	5,2	2687
Spidsand	28,2	17,4	27,4	27,0	3,1	479
Knarand	29,2	17,9	29,2	23,6	2,9	106
Pibeand	38,1	14,6	26,0	21,2	3,2	2631
Skeand	28,1	15,8	27,3	28,8	3,5	139
Krikand	18,4	11,7	39,8	30,1	6,0	3732
Atlingand	23,1	7,7	30,8	38,5	9,0	13
Ederfugl	66,0	8,3	14,5	11,2	3,1	2001
Sortand	62,6	15,3	9,8	12,3	1,4	163
Fløjlsand	71,4	21,4	0,0	7,1	0,3	14
Havlit	70,6	16,2	10,3	2,9	0,8	68
Hvinand	28,7	38,4	14,7	18,2	0,9	380
Taffeland	37,3	18,6	27,1	16,9	2,4	59
Bjergand	23,1	23,1	30,8	23,1	2,3	13
Troldand	31,3	27,0	21,3	20,3	1,5	689
Stor Skallesluger	50,0	45,5	4,5	0,0	0,1	22
Toppet Skallesluger	27,8	27,8	22,2	22,2	1,6	18
Blishøne	46,7		53,3		1,1	90
Grågås	70,2		29,8		0,4	724
Sædgås	81,3		18,7		0,2	16
Kortnæbbet gås	61,2		38,8		0,6	85
Blisgås	78,9		21,1		0,3	19
Canadagås	70,2		29,8		0,4	47
Dobbeltbekkasin	43,9		56,1		1,3	685
Skovsneppe	46,9		53,1		1,1	1242
Sølvmåge	21,4		78,6		4,7	103
Svartbag	17,3		82,7		6,1	52
Sildemåge	0,0		100		-	3

Tabel 1.
Antal indsendte vinger af de enkelte arter, og den procentvise fordeling af køn og alder og antallet af ungfugle per gammel hun for sæsonen 2006/2007. For arter hvor køn ikke kan bestemmes er vist antallet af ungfugle per gammel fugl.

Yngleresultater 2006/2007

Andelen af ungfugle per gammel hun var lavt for de fleste arter og fortæller, at 2006 generelt var en dårlig ynglesæson. Kun ederfugl og sortand lå over de sidste 25 års gennemsnit. For de samlede grupper lå svømmeænderne med en ynglesucces på 37 % under de sidste 25 års gennemsnit. Ynglesæsonen for dykænder lå på 50 % af gennemsnittet over de sidste 25 år, mens gæs samlet lå 20 % under. Ynglesuccesen for dobbeltbekkasin og skovsneppe lå henholdsvis 37 % og 55 % under gennemsnittet.


Fordelingen af vinger og jægere 2006/2007

I alt 492 jægere indsendte vinger fra 685 lokaliteter i sæsonen 2006/2007 (Tabel 2). Heraf var der ca. 130 nye bidragydere i forhold til sidste år. Indsenderne fordelte sig jævnt over Jylland, Fyn og Sjælland. Tre jægere indsendte vinger fra Bornholm, hvilket er en fremgang! I flere amter steg antallet af bidragydere, så der i alt var en beskedne fremgang på 21 indsendere i forhold til sidste sæson. Ses der bort fra vinger indsendt fra en vildthandler, blev der i gennemsnittet indsendt 26 vinger per jæger. Figur 1 viser fordelingen af indsendte vinger i 2006/2007.

	Antal jægere	Antal vinger	Antal lokaliteter
København	15 (-2)	46	3
Frederiksborg	19 (+2)	377	17
Roskilde	12 (+2)	130	12
Vestsjælland	27 (+7)	2419	38
Storstrøm	35 (+1)	1490	62
Bornholm	3 (+2)	60	4
Fyn	40 (-6)	1654	75
Sønderjylland	36 (+6)	922	57
Ribe	46 (+5)	1388	62
Vejle	21 (-11)	336	23
Ringkøbing	86 (+20)	2241	94
Århus	64 (+2)	1298	84
Viborg	39 (-5)	935	66
Nordjylland	49 (-1)	765	88
I alt	492 (+21)	14061	685

Tabel 2.

Fordeling på amter af antallet af indsendere af vinger, antallet af vinger og antallet af lokaliteter hvorfra der er indsendt vinger i sæsonen 2006/2007. Et mindre antal vinger er ikke medtaget i tabellen pga. manglende oplysninger. Frem- og tilbagegang i antallet af jægere i forhold til sæsonen 2005/2006 er vist i parentes.



Figur 1.

Den geografiske fordeling af samtlige indsendte vinger fra sæsonerne 2005/2006 og 2006/2007.

Der blev indsendt vinger fra i alt 685 forskellige lokaliteter. En del jægere, specielt fra København, har indsendt vinger fra fugle, der er nedlagt i andre amter end jægerens bopælsamt.