


Skovsneppe (*Scolopax rusticola*)

Woodcock

Skovsneppe har hidtil haft jagttid fra 1. oktober til 31. december. Fra og med sæsonen 2004/05 blev jagttiden udvidet til at omfatte perioden fra 1. oktober til 15. januar. Udbyttet af skovsneppe har de seneste år ligget på små 40.000 fugle per år.


Antal og fordeling – *Number and distribution*

I 2008/09 blev der indsendt 2662 vinger af skovsneppe, hvilket er ny rekord.




Figur 1. Geografisk fordeling af 2645 vinger af skovsneppe indsendt gennem jagtsæsonen 2008/09.

Geographical distribution of 2645 wings from Woodcock received during the hunting season 2008/09.




Figur 2. Antallet af indsendte vinger af skovsneppe fra jagtsæsonerne 1985/86-2008/09.
The number of Woodcock wings received from the hunting seasons 1985/86-2008/09.

Tidsmæssig fordeling – Temporal distribution




Figur 3. Tidsmæssig fordeling af vinger af skovsneppe nedlagt i jagtsæsonen 2008/09 og den gennemsnitlige fordeling for perioden 1985/86-2007/08 med 95 % konfidensintervaller.
Temporal distribution of wings from Woodcock bagged during the 2008/09 hunting season and the mean and 95% confidence intervals of the period 1985/86-2007/08.

Køns- og alderssammensætning – Sex and age composition



Figur 4. Køns- og alderssammensætning af skovsneppevinger gennem jagtsæsonen 2008/09. Antallet af vinger er angivet under søjlerne.
Sex and age composition of Woodcock wings during the hunting season 2008/09. The number of wings is shown below columns (columns from above: juvenile, adult)

Ynglesucces – Reproductive success



Figur 5. Ynglesucces for skovsneppe, udtrykt som antal ungfugle per gammel fugl i de indsendte vinger fra jagtsæsonerne 1985/86-2008/09.
Reproductive success of Woodcock expressed as the number of juveniles per adult of received wings from the hunting seasons 1985/86-2008/09.